

Citarin (Levamisol): gegen Lungenwürmer, bedingt gegen Darmhaarwürmer

Immer geben, auch wenn keine Lungenwürmer im Kot nachgewiesen werden.

Bei sehr schwachen und instabilen Igel, Behandlung wie in „2. Dosierungstabelle“ angegeben.
Vorher evtl. 3 Tage lang Bisolvon geben - am 3. und 5. Tag entwurmen.

Hinweis zur Herstellung einer 2,5% Lösung und zur Anwendung:

Unmittelbar vor der Injektion, „Levamisol 10“, 1:4 mit „Aqua dest.“, „Ringer“ oder „NaCL 0,9%“ verdünnen

 1 ml „Levamisol 10“ + 3 ml z.B. „Aqua dest.“ ergeben eine 2,5% Lösung Levamisol.

❖ s.c. - aspirieren - langsam spritzen !

Zum Verdünnen keine Glucose verwenden!!!

ENTWURMUNG MIT LEVAMISOL 2,5% (CITARIN) NEUE DOSIERUNG!!

1. Dosierungstabelle für stabile Igel


Quelle: „Igel in der Tierarztpraxis“

Gewicht/Dosierung/Wann:

1. Injektion*

- 100g / 0,025 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 200g / 0,050 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 300g / 0,075 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 400g / 0,20 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 500g / 0,25 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 600g / 0,30 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 700g / 0,35 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 800g / 0,40 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 900g / 0,45 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 1000g / 0,50 ml / 1x täglich (jeweils morgens)

* 2. Injektion nach 48 Std. mit derselben Dosierung wiederholen.

Bei starker Verwurmung, Behandlung nach 10-14 Tagen wiederholen. 

2. Dosierungstabelle für schwache und instabile Igel

Quelle: „Igel in der Tierarztpraxis“

Gewicht/Dosierung/Wann:

1. Injektion*

- 100g / 0,012 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 200g / 0,025 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 300g / 0,037 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 400g / 0,10 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 500g / 0,12 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 600g / 0,15 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 700g / 0,17 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 800g / 0,20 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 900g / 0,22 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 1000g / 0,25 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)

* 2. Injektion nach 48 Std. mit derselben Dosierung wiederholen.(*)

(*) Dosierung je nach Allgemeinzustand des Igels evtl. anpassen.
(siehe 1. Dosierungstabelle für stabile Igel)

Bei starker Verwurmung, Behandlung nach 10-14 Tagen wiederholen. 