

Citarin (Levamisol): gegen Lungenwürmer, bedingt gegen Darmhaarwürmer
Immer geben, auch wenn keine Lungenwürmer im Kot nachgewiesen werden.

1 Tag vor Entwurmungsbeginn mit Levamisol, den Igel zuerst mit Antibiotika behandeln!

Dann erst vorsichtig mit der Entwurmung mit Levamisol beginnen.

Bei sehr schwachen und instabilen Igeln, Behandlung wie in „2. Dosierungstabelle“ angegeben.
Vorher evtl. 3 Tage lang Bisolvon geben - am 3. und 5. Tag entwurmen.

Hinweis zur Herstellung einer 2,5% Lösung und zur Anwendung:

Unmittelbar vor der Injektion, „Levamisol 10“, 1:4 mit „Aqua dest.“, „Ringer“ oder „NaCL 0,9%“ verdünnen

 1 ml „Levamisol 10“ + 3 ml z.B. „Aqua dest.“ ergeben eine 2,5% Lösung Levamisol.

❖ s.c. - aspirieren - langsam spritzen !

Zum Verdünnen keine Glucose verwenden!!!

ENTWURMUNG MIT LEVAMISOL 2,5% (CITARIN) NEUE DOSIERUNG!!

1. Dosierungstabelle für stabile Igel


Quelle: „Igel in der Tierarztpraxis“

Gewicht/Dosierung/Wann:

1. Injektion*

- 100g / 0,025 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 200g / 0,050 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 300g / 0,075 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 400g / 0,20 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 500g / 0,25 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 600g / 0,30 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 700g / 0,35 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 800g / 0,40 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 900g / 0,45 ml / 1x täglich (jeweils morgens)
- 1000g / 0,50 ml / 1x täglich (jeweils morgens)

* 2. Injektion nach 48 Std. mit derselben Dosierung wiederholen.

Bei starker Verwurmung, Behandlung nach 10-14 Tagen wiederholen. 

2. Dosierungstabelle für schwache und instabile Igel

Quelle: „Igel in der Tierarztpraxis“

Gewicht/Dosierung/Wann:

1. Injektion*

- 100g / 0,012 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 200g / 0,025 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 300g / 0,037 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 400g / 0,10 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 500g / 0,12 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 600g / 0,15 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 700g / 0,17 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 800g / 0,20 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 900g / 0,22 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)
- 1000g / 0,25 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends)

* 2. Injektion nach 48 Std. mit derselben Dosierung wiederholen.(*)

(*) Dosierung je nach Allgemeinzustand des Igels evtl. anpassen.
(siehe 1. Dosierungstabelle für stabile Igel)

Bei starker Verwurmung, Behandlung nach 10-14 Tagen wiederholen. 